

Первая помощь


Первая помощь, если ребенок заболел коклюшем:

- срочно обратиться к врачу;
- создать спокойную обстановку;
- обеспечить влажный прохладный воздух;
- часто проветривать помещение;
- кормить маленькими порциями после кашля;
- обеспечить обильное питье.



Чего не стоит делать при коклюше:

- заниматься самолечением;
- применять горчичники и банки;
- нарушать режим лечения;
- посещать общественные места.



Коклюш



Симптомы

Коклюш – это острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель

Симптомы коклюша у ребенка:

Катаральный период – 1–2 недели:

- сухой кашель;
- насморк;
- небольшая температура;
- общее недомогание.



Период спазматического кашля – 2–8 недель:

- приступы кашля с репризами (свистящим вдохом);
- покраснение или посинение лица во время кашля;
- рвота после кашля;
- приступы чаще ночью.

Период разрешения – 2–4 недели:

- постепенное уменьшение кашля;
- сохранение слабости.



Профилактика

Профилактика коклюша:

- своевременная вакцинация;
- изоляция больных на 25 дней;
- регулярное проветривание помещений;
- влажная уборка с дезинфекцией;
- обучать детей правилам гигиены;
- не приводить в сад детей с кашлем.

