

## Первая помощь

Первая помощь, если ребенок заболел скарлатиной:

- вызвать врача;
- соблюдать постельный режим 5–7 дней;
- обеспечить изоляцию ребенка;
- давать лекарства по назначению врача;
- обеспечить щадящую диету и обильное питье;
- полоскать горло антисептическими растворами.



Чего не стоит делать при скарлатине:

- прерывать курс лечения;
- заниматься самолечением;
- отказываться от госпитализации при тяжелом течении;
- посещать общественные места.



# Скарлатина



## Симптомы


Скарлатина – инфекционная болезнь, вызванная  $\beta$ -гемолитическим стрептококком группы А (*Streptococcus pyogenes*).

Симптомы скарлатины у ребенка:



Начальный период:

- внезапное повышение температуры до 38–40°C;
- боль в горле при глотании;
- головная боль, слабость;
- тошнота, рвота.




Период разгара 2–3-й день:

- ярко-красная мелкоточечная сыпь на коже;
- «малиновый» язык с увеличенными сосочками;
- ангина с увеличением миндалин;
- бледный носогубный треугольник.

Период выздоровления:

- шелушение кожи на пальцах, стопах, ладонях;
- постепенное улучшение состояния.



## Профилактика

Профилактика скарлатины:

- изоляция больного ребенка на 21 день;
- регулярное проветривание помещений;
- влажная уборка с дезинфицирующими средствами;
- личная гигиена.

